

ی	و	غ	ا	س	پ	ر	م	ا	ت	ی	د	ل
ن	ه	ز	پ	ف	س	ر	ت	و	ل	ی	ت	ر
و	ی	ب	ی	ن	ا	ب	ی	ن	ی	و	س	چ
گ	و	ز	د	ک	س	ر	ح	ظ	ل	ض	ف	ق
و	ن	ا	ی	ث	و	ه	ق	ی	ک	آ	ط	ت
ت	ا	س	د	ی	ا	ل	د	ل	ک	ع	چ	و
ا	ث	ف	ی	ش	خ	ا	س	ر	ه	ئ	و	ز
م	ت	ن	م	گ	س	ق	و	م	ج	ر	خ	ف
ر	ا	ج	س	پ	س	ز	ی	ب	ی	ه	و	ک
پ	ف	ی	ر	ر	و	ا	ن	ک	ن	ن	د	ه
س	ص	م	د	م	ن	پ	ر	و	س	ت	ا	ت
ا	ج	ه	ی	ی	ت	ز	ص	ب	ع	ق	ه	ل
ئ	خ	ن	و	ر	ر	ت	س	و	ت	س	ت	ی

۱- این یاخته ها در همه مراحل زامه زایی ، پشتیبانی و تغذیه سلولهای جنسی و بیگانه خواری باکتری ها برعهده دارند.(س - ت - -)

۲-دو مجرای زامه بر در زیر مثانه وارد غده شده و به میزراه متصل می شوند.(ر - س - -)

۳-اسپرم ها ابتدا قادر به حرکت نیستند و باید حداقل ۱۸ ساعت در بماند تا توانایی حرکت در آنها ایجاد شود.(ا - ی - ی - م)

۴-در بین لوله های اسپرم ساز سلولهایی وجود دارند که نقش ترشح هورمون را بر عهده دارند. (ت - و - ت - ن)

۵-این غدد ، مایع غنی از فروکتوز را به اسپرم ها اضافه می کنند. (و - - ک - ل - - ن - ل)

۶-..... کلاه مانند و در جلوی هسته قرار دارد آنزیم های آن به اسپرم کمک می کنند تا بتوانند در لایه های حفاظت کننده تخمک نفوذ کنند. (آ - و - و - و)

۷-در تنه یا..... تعداد زیادی میتوکندری وجود دارد. (ق - - - م - ا - ی)

۸-بم شدن صدا ، روئیدن مو در صورت و قسمت های دیگر بدن و رشد ماهیچه ها و استخوان ها مثالهایی از بروز در مرد است. (ف - - - ث - و - ه)

۹-کار اصلی دستگاه تولید مثلی مرد..... یا زامه است. (ت - - ی - ا - پ - م)

۱۰-LH ، سلولهای را تحریک می کند تا هورمون جنسی مردانه را ترشح کنند. (ب - - ا - -)

۱۱-قرار گیری کیسه بیضه خارج از محوطه شکمی باعث می شود دمای درون آن حدود پایین تر از دمای بدن قرار گیرد. (س - - ر - ه)

۱۲-هر کدام از زام یاخته های ثانویه (اسپرماتوسیت ثانویه) با انجام میوز ۲ ، دو ایجاد می کند. (ا - - م - ت - د)

۱۳-دیواره لوله های زامه ساز ، یاخته های زاینده هی دارد که به این سلولها گفته می شود. (س - - م - ت - گ - -)

۱۴-غدد پیاپی میز راهی ترشحات قلیایی و را به مجرا اضافه می کنند. (ر - - ا - - ک - ن - ه)

۱۵-غده پروستات در انسان به اندازه یک گردو است و حالتی دارد. (س - - ج - -)