


۱. ساخت اسید نوکلئیک : به منظور انتقال صفات وراثتی
 ۲. ساخت ATP : شکل رایج انرژی شیمیایی قابل مصرف در سلول
 ۳. ساخت مولکولهای ناقله الکترون (مثل NAD و FAD و NADP) : به منظور پیشبرد واکنشهای نظیر تنفس سلولی (برای تولید انرژی) و فتوسنتز (برای تولید مواد آلی)
- دخالت نوکلئوتیدها در واکنشهای سوخت و ساز

علاوه بر اینکه نوکلئوتیدها واحدهای سازنده دنا و رنا هستند نقشهای اساسی دیگری نیز در یاخته برعهده دارند. برای مثال نوکلئوتید آدنین دار ATP انرژی رایج در سلول است و سلول در فعالیتهای مختلف از آن استفاده می کند.

انواع دیگری از ملکولها که نوکلئوتیدها در ساختار آنها شرکت دارند و به صورت ناقل الکترون در فرایندهای سلولی مانند تنفس سلولی و فتوسنتز شرکت دارند که در فصلهای بعد با آنها آشنا خواهید شد.



با توجه به اینکه دنا به عنوان ماده وراثتی، حاوی اطلاعات یاخته است چگونه این اطلاعات برای انتقال به سلولهای دیگر آماده می شوند؟ مدل واتسون و کریک وجود رابطه مکملی بین بازها این امکان را بوجود می آورد که از روی هر یک از رشتهها، رشتهای مکمل ساخته شود. به ساخته شدن ملکول دنا جدید از روی دنا قدیمی همانندسازی گویند. اگر چه با وجود رابطه مکملی بین بازها تا حد زیادی همانندسازی دقیق دنا

قابل توضیح است ولی بر همین اساس هم طرحهای مختلفی برای همانندسازی دنا پیشنهاد شده بود. شکل ۹ درمکانیسم حفاظتی، دو رشتهی دختر یک مولکول درگانهی (duplex) جدید، مولکول DNA را ساخته و مارپیچ والرن دست نخورده می ماند.

۱- همانندسازی حفاظتی - در این طرح هر دو رشته



دنا قبلی به صورت دست نخورده باقی مانده و وارد یکی از یاخته های حاصل از تقسیم می شوند و دو رشته دنا جدید هم وارد یاخته دیگر می شود. چون دنا اولیه در یکی از یاخته ها حفظ شده است به آن همانندسازی حفاظتی می گویند.

۲- همانندسازی نیمه حفاظتی (semi-conservative) - در این طرح در هر یاخته یکی از دو رشته دنا آن مربوط به دنا اولیه است و رشته دیگر با نوکلئوتیدهای جدید ساخته شده است. چون در هر یاخته حاصل فقط یکی از دو رشته دنا قبلی وجود

حفاظتی نیمه حفاظتی غیرحفاظتی

لوردیشی دارد به آن نیمه حفاظتی می گویند.

شکل ۹- طرح های مختلف برای همانندسازی درمکانیسم نیمه حفاظتی رشته های والرن موقتاً از هم جدا شده و هر یک از رشته ها با رشتهی دختر جفت شده با آن، یک مولکول درگانه را می سازد.

- طرازهایش معتبر انجام شده توسط مزلسون و استال، شواهدی قطعی حاصل شد که DNA دو رشته ای توسط مکانیسم نیمه حفاظتی همانندسازی می کند. (تکثیر DNA از محیط N^{15} به محیط N^{14} برده شد - ECOLI)
- باینر این رونویسی یک رشته DNA الگو به یک رشته مکمل و نیزگی محوسی همانندسازی DNA رونویسی DNA به RNA و ویرگی ترمیم و نوترکیب DNA محسوب می شود.

۳- همانندسازی غیر حفاظتی. در این طرح هر کدام از دناهای حاصل، قطعاتی از رشته های قبلی و رشته های جدید را به صورت پراکنده در خود دارند.

کدام طرح مورد تأیید قرار گرفته است؟

meselson stahl

مزلسون^۱ و استال^۲ با بکارگیری روش علمی پاسخ این پرسش را بدست آوردند. آنها فرضیه های متعدد ارائه شده را در نظر گرفتند و با توجه به امکانات، آزمایشی را طراحی کردند تا بتوانند به پاسخ قانع کننده ای برسند. برای شروع کار آنها می بایست بتوانند رشته های دنا نوساز را از رشته های قدیمی تشخیص دهند. آنها با این هدف دنا را با استفاده از ایزوتوپ سنگین نیتروژن (N^{15}) نشانه گذاری کردند.

دناهایی که با N^{15} ساخته می شوند نسبت به دنا معمولی که در نوکلئوتیدهای خود N^{14} دارد چگالی بیشتری دارند بنابراین با ابزارهایی مثل سانتریفوژ سرعت بالا^۳ می توان آنها را از هم جدا کرد.

آنها ابتدا باکتری های را در محیطی حاوی N^{15} کشت دادند. در ساختار بازهای آلی نیتروژندار که در ساخت دنا باکتری شرکت می کنند وارد شدند. پس از چندین مرحله رشد و تکثیر در این محیط، باکتری هایی تولید شدند که دنا سنگین تری نسبت به باکتری های اولیه داشتند.



سپس این باکتری ها را به محیط کشت حاوی N^{14} منتقل کردند. با توجه به اینکه تقسیم باکتری ها حدود ۲۰ دقیقه طول می کشد در فواصل ۲۰ دقیقه ای باکتری ها را از محیط کشت جدا و بررسی نمودند.

برای سنجش چگالی دناها در هر فاصله زمانی دنا باکتری ها را استخراج و در محلولی از سزیم کلراید در سرعتی بسیار بالا سانتریفوژ می کردند.

یک محلول غلیظ برای ایجاد شیب غلظت


با توجه به اینکه در سانتریفوژ میزان حرکت مواد در محلول براساس چگالی است و مواد سنگین تر تندتر حرکت می کنند. توانستند براساس میزان حرکت نوع دنا تشخیص داده در هر مرحله را تشخیص دهند. مراحل آزمایش مزلسون و استال و نتایج آن را در شکل ... می بینید.

همانطور که مشاهده می کنید نتایج این آزمایش نشان داد که همانندسازی دنا، نیمه حفاظتی است.

۱- Meselson
۲- Stahl
۳- Ultracentrifuge

DNA ای که در محیط حاوی ^{15}N تشکیل شده را وارد محیط حاوی ^{14}N می کنند

DNA با چگالی سنگین



After first doubling in ^{14}N

After second doubling in ^{14}N

پس از دومین بار همانندسازی DNA، ۴ DNA ایجاد شد که ۲ تا دارای چگالی متوسط و ۲ تا سبک هستند

طبق مثال فوق :

دفعات همانندسازی n ← تعداد DNA پس از $n = 2$ بار همانندسازی

تعداد DNA حاصل از n بار همانندسازی n مولکول DNA $= x_0 \times 2^n$ تعداد DNA اولیه

$$x_n = x_0 \times 2^n$$


چه نسبتی از رشته های DNA پس از n بار همانندسازی مادری هستند؟ (راديو اکتیو)

هر DNA ۲ رشته دارد $2^n \times 2$

چه نسبتی از رشته های DNA پس از n بار همانندسازی غیر راديو اکتیو هستند؟

۲ رشته که راديو اکتیو DNA اولیه $= \frac{(2^n \times 2) - 2}{2^n \times 2}$


Q - در صورت وار درگز سلول دارای DNA ^{15}N به محیط غیر رادیواکتیو (^{14}N) ، پس از ۳ نسل همانند سازی :
 الف / چند DNA در خود رشته ی رادیواکتیو دارند ؟
 ب / چه نسبتی از DNA ها دارای چگالی سبک هستند ؟



ابتدا: باکتری Ecoli که در محیط ^{15}N رشد و تکثیر شده است.



محیط حاوی: ^{15}N + نیک های آمونیوم
 نام E ابتدا در محیط رشد داده شد تا زمان کرماسی DNA سلول نشان را شوند.

باکتری ^{15}N به محیط کشت ^{14}N انتقال داده شده است.



سپس سلولها به محیط حاوی ایزوتوپ سبک طبیعی ^{14}N انتقال یافتند .
 نمونه ها به طور مرام از محیط کشت خارج شده و سانتریفیوژ شدند .
 در این روش ، ماکرومولها بر اساس جرم مخصوصشان از هم جدا می شوند .

نمونه های تهیه شده در سه زمان متفاوت



در بالای لوله تشکیل دادند پس نیمی از آنها چگالی متوسط و نیمی چگالی سبک داشتند .

شکل ۱۰- آزمایشات مزلسون و استال و نتایج آن

با مشخص شدن اینکه همانند سازی به صورت نیمه حفاظتی انجام شود سؤال دیگری مطرح شد: دو رشته دنا چگونه از یکدیگر باز می شوند؟ آیا هر دو رشته کاملاً از یکدیگر جدا می شوند و سپس همانند سازی انجام می شود یا جدا شدن دو رشته تدریجی و همراه با آن همانند سازی انجام می شود.
 تحقیقات نشان داده است که فقط در محلی که قرار است همانند سازی انجام شود دو رشته از هم بازمی شوند . بقیه قسمت ها بسته هستند و به تدریج باز می شوند .

شکل آزمایشات مزلسون و استال و نتایج بدست آمده :

الف - دنا ی باکتری های اولیه پس از سانتریفیوژ یک نوار در انتهای لوله تشکیل دادند چون هر دو رشته دنا ی آنها ^{15}N و

چگالی سنگینی داشت . ^{15}N سنگین


ب - دنا ی باکتری های حاصل از دور اول همانند سازی (بعد از ۲۰ دقیقه) پس از سانتریفیوژ نواری در میانه لوله تشکیل دادند.

پس دنا ی آنها چگالی متوسط داشت . ^{14}N متوسط

پ - دنا ی باکتری های حاصل از دور دوم همانند سازی (بعد از ۴۰ دقیقه) پس از سانتریفیوژ دو نوار ، یکی در میانه و دیگری

در بالای لوله تشکیل دادند پس نیمی از آنها چگالی متوسط و نیمی چگالی سبک داشتند . ^{14}N سبک

^{15}N متوسط



«جهت 3 → 5»

عوامل و مراحل همانندسازی

در همانندسازی سه عامل مؤثر است:

- ملکول دنا به عنوان الگو

- آنزیمی که نوکلئوتیدها را به صورت مکمل کنار یکدیگر قرار دهد.

- واحدهای سازنده دنا که بتوانند در کنار هم نسخه مکمل الگو را بسازند. این واحدها نوکلئوتیدهای سه فسفات هستند.

قبل از همانندسازی دنا باید پروتئینهای اطراف آن یعنی هیستونها از آن جدا شوند تا همانندسازی بتواند انجام شود پس از آن دو رشته الگو هم باید از هم باز شوند.

به نظر شما برای باز شدن دو رشته دنا چه پیوند هایی باید شکسته شوند؟ **پیوندهای هیدروژنی (بامصرف آب)**

آنزیم **هلیکاز**^۱ این کار را انجام میدهد. این آنزیم ابتدا مارپیچ دنا را باز می کند سپس دو رشته دنا را در محلی ایجاد چنگال همانندسازی از هم فاصله میدهد. شکل ۱۱

جایگاه آغاز همانندسازی = origin of replication



• هلیکاز هر دو ۱۸ نوکلئوتید را می پوشاند و پیوند هیدروژنی بین دو رشته را می شکند و جلو می برد. (بامصرف آب)

• DNA پلیمراز که جلوتر می رود، دو رشته ی DNA در پشت سر آن به هم متصل می شوند (یعنی تشکیل پیوندهای هیدروژنی).

شکل ۱۱- همانندسازی در دنا

انواعی دیگری از آنزیم ها با همدیگر فعالیت می کنند تا یک رشته دنا در مقابل رشته الگو ساخته شود. یکی از مهمترین آن ها که نوکلئوتیدهای مکمل را با نوکلئوتیدهای رشته الگو جفت می کند **دنا بسپاراز**^۲ (دنا پلی مرز) است.

دو راهی همانندسازی

در محلی که دو رشته دنا از یکدیگر جدا شده اند، ساختار Y ماندی بوجود می آید که دو راهی همانندسازی نام دارد. در این محل پیوند هیدروژنی بین دو رشته گسیخته و دو رشته از یکدیگر باز شده اند. همچنین پیوندهای فسفودی استر جدیدی در حال تشکیل هستند. دنا بسپاراز نوکلئوتیدها را به انتهای رشته در حال تشکیل اضافه

• کاربرد آنزیم **در آزمایشگاه برای همانندسازی**: مثلاً **Taq polymerase** که از باکتری های ترموفیل (حرارت دوست) استخراج شده و در PCR کاربرد دارد. اثر دما بر فعالیت آنزیم ها در آزمایش سنجیده می شود.

در پروتکل های آزمایشگاهی، تنظیم، کنترل و یا تغییر دما یک وجه معمول است و در بسیاری زمینه ها مانند کشت بافت و آنکوباسیون، امپلیفیکاسیون DNA و در PCR و حتی در کارهای آزمایشگاهی تولید مثل و درمان ناباروری و ... می توان از تأثیر متفاوت دما در انجام کار بهره برد.

^۲ Helicase
^۱ Polymerase دنا

Single strand Binding Protein

سولومون پیروسی تا پایداری کننده مارپیچ

○ همانندسازی DNA

• ابتدا آنزیم هلیکاز دورشته‌ی DNA را به صورت زیپ مانند از هم باز می‌کند (قطع پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازهای آلی) و چنگال همانندسازی را تشکیل می‌دهد.

• درانه‌هایی Pr باعث می‌شوند تا دو رشته‌ی باز شده‌ی DNA درگیر به هم وصل نشوند.
• دورشته‌ی DNA پیشرو و پیرو باید از طرف 5' به 3' همانندسازی شوند و رشته‌های دختری ساخته شده با رشته‌ی مادری (الگو) ناهمسو باشند.

• در رشته‌ی پیشرو، رشته‌ی جدید به صورت پیوسته (5' → 3') در حال ساخت است.
• در رشته‌ی پیرو، رشته‌ی جدید به صورت قطعه قطعه (قطعات آکازاکی 5' → 3') ساخته شده و توسط آنزیم DNA لیگاز به هم متصل می‌شوند.

• در رشته‌ی پیرو: پرایماز → ساخت پرایمر در ابتدای قطعات آکازاکی → ادامه‌ی نوکلئوتیدهای قطعات آکازاکی از محل 3'OH آزاد

۱. سنتز DNA، در جایگاه آغاز همانندسازی شروع می‌شود.
۲. رشته‌ها در جایگاه آغاز همانندسازی از یکدیگر جدا می‌شوند و پیچ خوردگی توسط هلیکاز از بین می‌رود.
هلیکاز در طول مولکول DNA در جلوی آنزیم‌های سنتز کننده‌ی DNA حرکت می‌کند.
ناحیه‌ی فعال سنتز DNA همان منطقه‌ی دوراهی همانندسازی است که در محل تقاطع تک رشته‌ها و ناحیه‌ی دو رشته‌ای ایجاد می‌شود. هر دو رشته در نزدیکی دوراهی همانندسازی (در جهت 3' → 5') سنتز می‌شوند.
۳. حاصل همانندسازی ایجاد دو مولکول دختر است که هر کدام شامل یک رشته‌ی قدیمی و یک رشته‌ی تازه سنتز شده می‌باشد.

آنزیم‌هایی که در همانندسازی DNA شرکت می‌کنند (سولومون)	
DNA هلیکازها	بزرگ‌ترین مایع مضاعف با شستن پیوندهای هم‌رشته‌ای که دورشته را به یکدیگر متصل نگه می‌دارند.
توپوایزومرازها	یک یا دورشته‌ی DNA را بشکنند، مانع افزایش پیچ خوردگی DNA در همانندسازی می‌شوند و سپس آن‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند.
DNA پلیمرازها	زیر واحدهای نوکلئوتیدی را به یکدیگر متصل می‌کنند.
DNA پرایماز	۱. RNAهای پرایمر کوتاه را روی رشته‌ی پیرو سنتز می‌کنند. ۲. سبب شروع همانندسازی رشته‌ی پیشرو می‌شوند.
DNA لیگاز	اتصال قطعات آکازاکی
توپوایزومراز	DNA تلومری را طول می‌کشد

- آنزیم‌هایی که در هاشد سازی DNA شرکت می‌کنند: نوپرایزومراز، هلیکاز، پرایماز، DNA پلیمراز I و II و III
- نوپرایزومراز: پیچ رشته‌های DNA را کم می‌کند. و مانع از ایجاد گره در طی هاشد سازی می‌شود.
- هلیکاز: قطع پیوندهای هیدروژنی بین جفت بازها را آسان می‌کند و در نتیجه DNA می‌شکند.

می‌کنند اضافه شدن یک نوکلئوتید بستگی دارد به نوع بازی که در نوکلئوتید رشته الگو قرار دارد. هر نوکلئوتید

باید با باز روی رشته الگو مکمل باشد. با اضافه شدن هر نوکلئوتید سه فسفات دو تا از فسفات‌های آن از ملکول سولوموتس → این را گسش قویا انرژی تراست و نیاز به انرژی اضافی ندارد.

جدا می‌شوند. (شکل ۱۲)

- DNA پلیمراز III: با داشتن الگو وجود $3'OH$ آزار، تا در به اضافه کردن نوکلئوتیدها به نوکلئوتید قبلی است (در جهت $5' \rightarrow 3'$)
- DNA پلیمراز III می‌تواند قطعات در حد ۵-۴ کیلو دالتون از DNA بسازد.
- DNA پلیمراز II: قطعات ساخته شده توسط DNA پلیمراز III را به هم متصل می‌کند تا قطعات در حد ۲۰-۱۸ کیلو دالتون بسازد.
- DNA پلیمراز II گاه نقش ترمیمی (ویرایش غلطها) را نیز در جهت $5' \rightarrow 3'$ دارد.

دو راهی همانند سازی

رشته الگو

نقطه شروع هاشد سازی با صدأ قطعات اکازاکی متفاوت است.



ترجمه: در هر چنان هاشد سازی ۲ هاشد و آنزیم‌ها، برای ساخته رشته‌ی دختر جمع می‌یابند.

رشته رهبر (پیشرو) رشته در حال تشکیل (Leading strand)

- DNA پلیمراز I: خاصیت لیگازی دارد و قطعات ساخته شده توسط DNA پلیمراز II را به هم متصل می‌کند تا قطعات درشت تری از موکل DNA حاصل شود.

شکل ۱۲ - همانند سازی دنا


فعالیت‌های آنزیم دنا بسپاراز

همانند سازی دنا با دقت زیادی انجام می‌شود این دقت تا حدود زیادی مرهون رابطه مکملی بین نوکلئوتیدها است. اگر چه آنزیم نوکلئوتیدها را بر اساس رابطه مکملی کنار هم قرار می‌دهد ولی گاهی در این مورد اشتباهی هم صورت می‌گیرد مثلاً در مقابل A به جای T، C قرار گیرد. برای جلوگیری از این اشتباه آنزیم دنا پلی‌مراز پس از برقراری پیوند فسفودی استر، یکبار برگشت می‌کند و نوکلئوتید را بازبینی می‌کند که رابطه آن صحیح است یا غلط. اگر اشتباه باشد آن را حذف می‌کند و نوکلئوتید صحیح را قرار می‌دهد. برای حذف نوکلئوتید غلط باید بتواند پیوند فسفودی استر را بشکند و آن را از دنا جدا کند. توانایی بریدن دنا را فعالیت نوکلئازی گویند که در آن پیوند فسفودی استر می‌شکند. بنابراین آنزیم دنا بسپاراز هم فعالیت بسپارازی (پلیمرازی) دارد که در آن پیوند فسفودی استر را تشکیل می‌دهد و هم فعالیت نوکلئازی که در آن پیوند فسفودی استر را برای تصحیح اشتباه می‌شکند. فعالیت نوکلئازی دنا بسپاراز که باعث تصحیح اشتباهات در همانند سازی می‌شوند را ویرایش می‌گویند.

- DNA پلیمراز I در پرکرن GAPها (فاصله‌ها) DNA نیز عمل می‌کند.


تأ DNA کامل شود و طول کروماتین حاصل شود. رتبه‌ی دیگر DNA پلیمراز I: خاصیت تغییر و ترجمه همزمان می‌تواند هم خاصیت نوکلئازی و هم لیگازی و هم پلیمرازی داشته باشد.

- RNA پلیمراز ویژه‌ای به نام پرایماز، پرایمر کوتاه حدود ۱۲ نوکلئوتید از جنس RNA به صورت مکمل با DNA الگویی سازد.
- DNA پلیمراز I با خاصیت نوکلئازی خود، قطعه پرایمر را برش داده و در جای آن نوکلئوتیدهای مکمل DNA را پلیمریزه می‌کند.
- DNA پلیمراز I رشته‌ی DNA تازه سنتز شده را بازخوانی کرده و در صورت برخورد با نوکلئوتید نامناسب، با خاصیت نوکلئازی خود، نوکلئوتید نامناسب را حذف و با خاصیت لیگازی خود، نوکلئوتید مناسب را متصل می‌کند.
- DNA پلیمراز I می‌تواند به عنوان ترنسفر از انتهای نیز استفاده شود تا یک نوکلئوتید خاص را به زنجیره اضافه کند.



• **اپیزوم** : معادل یوکاریوتی پلازمیدهای باکتریایی هستند .
 در یوکاریوت ها به طور معمول اپیزوم ها ، DNA های حلقوی بسته ای هستند که داخل هسته تکثیر پیدا می کنند مانند آدنوویروس ها ، هرپس ویروس ها پولیوما ویروس ها
 برخی از اپیزوم های ویروسی در سیتوپلاسم تکثیر پیدا می کنند مانند پوکس ویروس ها

• **پلازمیدها** : برخی ویژگی ها را به باکتری می دهند که به بقای باکتری کمک می کند .
 • اگر پلازمیدهای سلوله حذف شوند ، سلول می تواند به زندگی خود ادامه دهد .
 • هم اند سازی پلازمید ارتباط چندانی با چرخه سلولی و تقسیم سلولی ندارد . آنها می توانند مستقل از چرخه سلولی به تعداد نامحدود تکثیر شوند .
 • در هر سلول ممکن است چندین پلازمید مشابه وجود داشته باشد .
 • از طریق **هم یوخی (conjugation)** به باکتری دیگر منتقل می شود .



همانند سازی در پروکاریوتها و یوکاریوتها

یعنی غشای هسته و هسته سی سازها بافته ندارند

پروکاریوتها که همه باکتریها را شامل می شوند اطلاعات وراثتی آنها در غشا محصور نشده است. کروموزوم

اصلی آنها به صورت یک ملکول دنا حلقوی است، در سیتوپلاسم قرار دارد و به غشای سلول متصل است. معمولاً حلقوی است اما نمونه های خطی نیز دارد.

پروکاریوتها علاوه بر دنا اصلی مولکول هایی از دنا دیگری را نیز به نام پلازمید در اختیار دارند. اطلاعات

این ملکول ها می تواند ویژگی های اضافه تری را به میزبان بدهند. مثلاً ژن مقاومت به آنتی بیوتیک در پلازمید وجود دارد.

در یوکاریوتها که بقیه موجودات زنده یعنی آغازیان، قارچ ها، گیاهان و جانوران را شامل می شوند دنا در هر

کروموزوم به صورت خطی است و مجموعه ای از پروتئین ها به نام هیستون در کنار آن قرار دارند. کروموزوم کواوتی = DNA + هیستون

کروموزوم ها و دنا درون هسته قرار دارند و به آن دنا (دنا) هسته ای گفته می شود. در یوکاریوتها علاوه بر

هسته در سیتوپلاسم نیز مقداری دنا وجود دارد که به آن دنا سیتوپلاسمی گفته می شود. این نوع از دنا که

SDNA هسته ای (خطی)

حالت حلقوی دارد در میتوکندری و کلروپلاست دیده می شود. DNA در یوکاریوتها SDNA سیتوپلاسمی (حلقوی)

اغلب پروکاریوت ها فقط یک نقطه آغاز همانند سازی در دنا خود دارند این نقطه در جایگاه خاصی از دنا قرار


دارد در این قسمت دو رشته دنا از هم باز می شوند. تحقیقات نشان داده است همانند سازی دو جهتی در باکتری

ها هم وجود دارد یعنی در یک نقطه در دو جهت همانند سازی شروع و ادامه می یابد تا به همدیگر رسیده و

همانند سازی پایان می یابد. شکل

Replication bubble

بیه حباب همانند سازی



شکل ۱۳- همانند سازی دو جهتی دنا در پروکاریوت ها

در یوکاریوتها به دلیل وجود مقدار زیاد دنا و قرار داشتن در چندین کروموزوم که هر کدام از آنها چندین برابر

یک دنا باکتری هستند مسئله همانند سازی دنا بسیار پیچیده است.

حتی اگر فقط یک نقطه شروع در هر کروموزوم هم داشته باشند مدت زمان لازم برای انجام همانند سازی خیلی

زیاد می شود. حل این مسئله در یوکاریوتها با شروع همانند سازی در چندین نقطه در هر کروموزوم انجام شده

است.

تعداد نقطه های آغاز مورد استفاده در یوکاریوت ها حتی می تواند بسته به مراحل رشد و نمو تنظیم شود ابتدا با

تعدادی آغاز می شود هنگامی که سرعت تقسیم سلولی زیاد می شود تعداد نقاط شروع مورد استفاده نیز افزایش

↑ سرعت تقسیم سلولی → ↑ تعداد نقاط شروع همانند سازی
مثال: مریض و بلاستوسیت (درمان جنینی): سرعت تقسیم زیاد است.
↓ سرعت تقسیم سلولی → ↓ تعداد نقاط شروع همانند سازی
مثال: پست از تشکیل اندامها (در جنینی): سرعت تقسیم کم می شود.

تألیف: دکتر گستره امتیازی و

محسن کریمی

آزمایش‌های شرکت کننده در هماهنگ‌سازی DNA در باکتری *E. coli* (کتاب جانز و بنت مولکولی وراثت و ژنتیک)

DNA پلیمراز I :

- (۱) خاصیت پلیمرازی $5' \rightarrow 3'$
- (۲) خاصیت آنزوفولکلنازی در هر دو جهت $5' \rightarrow 3'$ و $3' \rightarrow 5'$ مربوط به قطعه‌ی کلینفو
- (۳) حذف پرایمر

DNA پلیمراز II :


- (۱) فعالیت آنزوفولکلنازی $3' \rightarrow 5'$

DNA پلیمراز III :

- (۱) خاصیت پلیمرازی $5' \rightarrow 3'$
- (۲) خاصیت آنزوفولکلنازی در هر دو جهت $5' \rightarrow 3'$ و $3' \rightarrow 5'$
- (۳) یک هولوآزیم است با ۱۰ زیر واحد ($\alpha \epsilon \theta \beta \gamma \delta \delta \pi \psi$)
مهم‌ترین α

یابد. و پس از آن اگر بخواهد سرعت تقسیم کاهش یابد نقاط آغاز هم کاهش می یابند. مثلا در دوران جنینی در مراحل مورولا و بلاستوسیت سرعت تقسیم زیاد و نقاط آغاز هم زیاد است ولی پس از تشکیل اندام ها سرعت تقسیم و نقاط آغاز کم می شوند.

بنابراین در یوکاریوتها در هر کروموزوم همانندسازی در چندین نقطه آغاز می شود که در هر کدام همانندسازی در دو جهت انجام می شود. شکل ۱۴



شکل ۱۴ همانند سازی در یوکاریوت ها

- DNA یوکاریوت دارای چندین منشأ، همانندسازی هستند. (دوجبهته)
- DNA پروکاریوتین اغلب دارای یک منشأ، همانندسازی هستند. (دوجبهته)

- در یوکاریوت ها : چندین جایگاه آغاز همانند سازی
- چندین حباب همانند سازی
- چندین چنگال همانند سازی