

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ بعضی ژن‌ها مانند ژن سازنده هموگلوبین

فقط در گویچه‌های قرمز بروز می‌کنند و
مثلاً در یاخته‌های بافت پوششی پوست
بروز نمی‌کنند.

■ فقط یکی از دو رشته‌ی دنا در هر ژن

رونویسی می‌شود.

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ رشته‌ی مورد رونویسی یک ژن ممکن است
با رشته مورد رونویسی ژن مجاور خود یکسان
یا متفاوت باشد.

■ در بسیاری از رناها تغییرات انجام می شود
و این مولکول ها برای انجام کارهای خود
دستفوش تغییراتی می شوند.

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ رنای پیک ممکن است دستفوش تغییراتی

در هین رونویسی و یا پس از آن شود.

■ در بعضی ژن ها، توالی های معینی از رنای

سافته شده، جدا و حذف می شود و سایر بفش

ها به هم متصل می شوند و یک رنای پیک

یکپارچه می سازند.

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ بعضی ژن‌ها، مانند ژن‌های سازنده رنای رناتنی در یاخته‌های تازه تقسیم شده بسیار فعال اند.

■ رنای‌های ناقل به جنز در ناحیه پاد رنزه ای، در همه انواع توالی‌های مشابهی دارند.

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ در مرحله طویل شدن ترجمه ممکن است
رناهای ناقل مفتلفی وارد جایگاه A، رناتن
شوند ولی فقط رنایی که مکمل رمزه جایگاه
A است، استقرار پیدا می‌کند؛ در غیر این
صورت جایگاه را ترک می‌کند.

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ ممکن است پروتئین‌ها در بخش‌های

مفتلفی از یاخته ساخته شوند.

■ به طور کلی پروتئین‌سازی در هر بخشی از

یاخته که رِناَتِن‌ها حضور داشته باشند می

تواند انجام شود.

جریان اطلاعات در یاخته‌ها

■ بعضی از پروتئین‌های ساخته شده در
سیتوپلاسم به شبکه آندوپلاسمی و دستگاه
گلژی می‌روند و ممکن است برای ترشح
به خارج رفته یا به بخش‌هایی مثل کریپه و
کافنده تن بروند.