


تنفس نوری: مانع فتوستنز

✱ آنزیم روبیسکو که آغاز کننده چرخه کا لوین است، می تواند با اکسیژن نیز واکنش دهد. به عبارت دیگر، این آنزیم نه تنها موجب کربوکسیله شدن ترکیب 5 کربنی (ترکیب آن با CO_2) می شود، بلکه واکنش اکسیژناسیون (ترکیب با O_2) آن را نیز کاتالیز می کند. به همین دلیل، این آنزیم به روبیسکو (ریبولوز بیس فسفات کربوکسیلاز – اکسیژناز) مشهور شده است.

بنابراین:

✱ در تنفس نوری:

- مولکول 5 کربنی که با اکسیژن ترکیب شده است ، تجزیه و از آن یک مولکول 3 کربنی و یک مولکول 2 کربنی حاصل می شود.
- مولکول 2 کربنی از کلروپلاست خارج و در نتیجه واکنش هایی که بخشی از آن ها در میتوکندری ها انجام می شود، از آن یک مولکول CO_2 آزاد می شود .



درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده

* توجه داشته باشید که : در فرآیند تنفس نوری، بر خلاف تنفس سلولی، مولکول ATP تولید نمی شود.

چند نکته جانبی

1- اسید 2 کربنی تولید شده در استرومای کلروپلاست، اسید گلیکولیک ($\text{CH}_2\text{OH COOH}$) نام دارد. گروه کربوکسیل (COOH -) این اسید منبع CO_2 حاصل از تنفس نوری است.


2- در واکنش کربوکسیلاسیون رویسکو، CO_2 به کربن شماره 2 ریبولوز بیس فسفات متصل می شود حاصل، ترکیب 6 کربنی ناپایدار است. سپس طی فعل و انفعالی، پیوند بین اتم های کربن 2 و 3 در مولکول 6 کربنی شکسته شده و دو ترکیب 3 کربنه ی 1 فسفات (PGA) تولید می شود.

3- اسید 2 کربنی (اسید گلیکولیک) پس از تولید از کلروپلاست خارج و وارد پراکسی زوم می شود (پراکسی زوم ها ارتباط مکانی نزدیکی با کلروپلاست ها و نیز میتوکندری ها دارند و تعداد آن ها به ویژه در سلول های پاراننشیمی گیاهان C_3 بسیار زیاد است). حاصل عملکرد آنزیماتیک در پراکسیزوم، تبدیل اسید گلیکولیک به آمینو اسید 2 کربنی گلیسین است.

سپس، گلیسین از پراکسی زوم ها خارج و به میتوکندری ها وارد می شود. در میتوکندری، دو مولکول گلیسین 2 کربنی واکنش داده و یک مولکول سرین 3 کربنی تولید می کنند.

سرین تولید شده از میتوکندری ها خارج و به پراکسی زوم ها وارد می شود.

1 کربن باقی مانده از تبدیل دو گلیسین 2 کربنی به یک سرین 3 کربنی، تأمین کننده کربن CO_2 آزاد شده در تنفس نوری است.



درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده

شاید بخواهیم برون سرنوشت سرین تولیدی در میتوکندری و همینطور C_3 پی میوه ؟

- سرین تولید شده از میتوکندری ها خارج و به پراکسی زوم ها وارد میشه و در اونجا به ترتیب به اسید هیدروکسی پیروویک و اسید کلسریک تبدیل میشه ' اسید کلسریک از پراکسی زوم ها خارج و وارد کلروپلاست ها میشه و در اونجا به وسیله ی ATP فسفوره و به اسید فسفوکلسریک تبدیل میشه .

فلاصه این که : 2 مولکول اسید فسفوکلیکولیک (اسید 2 کربنی) که از طریق فعل و انفعال اکسیژناز تولید شدن ' سرانجام به یک مولکول Co_2 و یک مولکول اسید فسفوکلسریک تبدیل میشن ☺


- موضوع بعدی اینه که این همه اسید فسفوکلسریک تکلیفش چیه ؟ شب معلومه رگه ! اسید فسفوکلسریک همون PGA فورمونه ، بنابراین روشنه که به PGA های پرفه ی کا لوین اضافه میشه

سازگاری های ویژه ای تنفس نوری را کاهش می دهند :

* هوای گرم و خشک ، تعرق گیاه را افزایش می دهد .
از طرفی ، افزایش تعرق باعث می شود تا گیاه آب را از راه روزنه ها از دست بدهد .

روزنه های بسیاری از گیاهان در هوای گرم و خشک بسته می شوند.

* بسته بودن روزنه ها ممکن است دی اکسید کربن برگ را به حدی پایین بیاورد که وضع را برای انجام تنفس نوری مناسب سازد. زیرا Co_2 نه تنها وارد برگ نمی شود، بلکه با انجام فتوسنتز مصرف هم می شود.



* در انتها یک سؤال : برای مقابله با این وضع ، چه سازگاری هایی در گیاهان انجام شده است؟

به نظر می رسد هر عاملی که شدت تعرق را در گیاه کاهش دهد و به باز ماندن بیشتر روزنه ها در هوای گرم و خشک کمک کند، یک سازگاری در این راستا محسوب می شود.

چرخه گیاهان C₄

★ گیاهان چهار کربنی یا C₄، علاوه بر آنزیم های مورد نیاز چرخه چهار کربنی، دارای آنزیم های چرخه ی کالوین نیز هستند اما مواد لازم برای واکنش های این دو چرخه در یک سلول وجود ندارند. در نتیجه، واکنش ها در سلول های مختلفی از برگ انجام پذیر هستند.

★ در اطراف دسته های آوندی برگ گیاه C₃ و C₄، یک لایه سلول پارانشیمی به نام غلاف آوندی قرار دارد (Bundle sheath). این یاخته ها در گیاهان C₄، کلروپلاست دار و محل انجام چرخه کالوین هستند. بین سلول های غلاف آوندی فضایی وجود ندارد (سلول هایی فشرده اند). همچنین، بین غلاف آوندی و دسته های آوندی فضایی دیده نمی شود. غلاف آوندی چنان دستجات آوندی را احاطه کرده است که انتقال مواد از سلول های پارانشیمی اطراف غلاف آوندی (سلول های مزوفیلی که در کتاب با عنوان یاخته های میان برگ معرفی شده اند) به دستجات آوندی، باید از طریق سلول های غلاف آوندی صورت گیرد.


★ در گیاهان C₄ چرخه کالوین در کلروپلاست سلول های غلاف آوندی و چرخه چهار کربنی (چرخه ی منجر به تولید OAA) در کلروپلاست سلول های مزوفیلی انجام می گیرد. سلول های مزوفیلی و غلاف آوندی به وسیله ی رشته هایی سیتوپلاسمی با هم در ارتباط اند و از همین راه تبادل مواد بین آن ها صورت می گیرد.

★ در گیاهان C₄، CO₂ ای که در کلروپلاست سلول های مزوفیلی به کار گرفته می شود، عمدتاً از طریق روزنه های هوایی دریافت شده است اما CO₂ ای که در چرخه کالوین کلروپلاست سلول های غلاف آوندی مصرف می شود، در خود این سلول ها طی واکنشی تولید شده است. تولید CO₂ که لازمه تولید قندهای 6 کربنه است، بازده فتوسنتزی این گیاهان را افزایش می دهد.

★ از جمله گیاهان C₄، می توان به ذرت و نیشکر اشاره نمود.

چرخه گیاهان C₄ (چرخه اسیدهای 4 کربنه دی کربوکسیلی)

A- واکنش های سلول مزوفیلی: (در سنتوسل و کلروپلاست)





فسفوآنول پیروات

اگزا لواستیک اسید (نخستین فرآورده)





درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده



تذکر: مالات در برخی از گیاهان C_4 ، فرآورده فتوسنتزی پایدار است. اما در گروهی دیگر از آن ها و طی واکنشی که در سیتوپلاسم سلول مزوفیلی انجام می شود، فرآورده پایدار دیگری به نام آسپاراتات جایگزین مالات می گردد. (به این مطلب در متن کتاب اشاره نشده است.)


فرآورده ی تولیدی سلول مزوفیلی (مالات یا آسپاراتات) از طریق پلاسمودسم ها به سلول های غلاف آوندی مهاجرت می کند و در آن جا مالات چهار کربنه متحمل دکرپوکسیلاسیون شده و با از دست دادن CO_2 ، اسکلت سه کربنه تولید می کند.

B- واکنش های سلول غلاف آوندی : در کلروپلاست



CO_2 با ورود به کلروپلاست و شرکت در چرخه کالوین، کربوهیدرات سازی انجام می دهد


پيروات تولیدی در سیتوپلاسم سلول های غلاف آوندی در گیاهان C_4 ، از طریق پلاسمودسم ها به سلول های مزوفیلی مهاجرت کرده و در آن جا به ماده اولیه چرخه یعنی PEP تبدیل می شود. (بازسازی پذیرنده




درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده

+ CO₂

★ خلاصه ی چرخه C₄ :



★ خلاصه ی دیگری از چرخه ی C₄ :



گیاهان C₄ برای تثبیت CO₂ از مسیری دو مرحله ای استفاده می کنند. در این مسیر، دو سیستم آنزیمی متفاوت و مجزا (در دو سلول مختلف) درگیر هستند: اولین سیستم در سلول های میان برگ (در کلروپلاست و نیز سیتوپلاسم) عمل می کند. این سیستم آنزیمی در واکنش های مربوط به ترکیب دی اکسید کربن با یک اسید 3 کربنی (فسفو انول پیروات = PEP) شرکت می کند . اسید 4 کربنی حاصل (اسید ما لیک) به سلول های غلاف آوندی منتقل می شود.

درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده

دومین سیستم آنزیمی در سلول های غلاف آوندی (در کلروپلاست و سیتوپلاسم) عمل می کند. در این سلول ها، دی اکسید کربن از اسید 4 کربنی آزاد و وارد چرخه کالوین می شود (نتیجه : تولید پیرووات) و همانند چرخه ی کالوین در گیاهان C_3 ، قند سه کربنی را می سازد. (پیرووات حاصله هم با ورود به سلول مزوفیلی، به فسفو انول پیرووات تبدیل می شود)

سیستم آنزیمی که در سلول های میان برگ وجود دارد ، به طور مؤثری منجر به انتقال دی اکسید کربن به درون سلول های غلاف آوندی می شود (در اثر تجزیه مالات یا آسپاراتات) بنابراین تراکم CO_2 درون سلول های غلاف آوندی در مقایسه با جو بیش تر است . این حالت، وضع را برای انجام فتوسنتز مناسب می کند و مانع از انجام تنفس نوری می شود. وجود تراکم با لای دی اکسید کربن در اطراف آنزیم روبیسکو (کلروپلاست و سیتوپلاسم سلول غلاف آوندی) در گیاهان C_4 سبب شده است که حتی با وجود دماهای بالا و شدت های نور زیاد (عوامل مناسب برای تنفس نوری)، این گیاهان بر تنفس نوری غلبه کنند و لذا می توانند در حالی که روزنه های آن ها تقریباً بسته است، در دماهای بالا و شدت های نور زیاد با بیش ترین کارایی عمل کنند و همچنین مانع از افزایش دفع آب شوند. به همین دلیل گیاهان C_4 در آب و هوای گرم سریع تر از گیاهان C_3 رشد می کنند.

کارایی گیاهان C_4 در دمای بالا ، شدت نور زیاد یا کمبود آب، تقریباً دو برابر گیاهان C_3 است.

دو خصوصیت در چرخه گیاهان C_4 وجود دارد که بر زیان های ناشی از افزایش درجه ی حرارت فائق می آیند:

اول این که : قدرت کاتالیزوری آنزیم تولید کننده OAA (آنزیم کربوکسیله کننده ی PEP) بالاست و از این رو با غلظت CO_2 ای معادل CO_2 هوا اشباع می گردد. گیاهان C_4 می توانند ضمن بسته تر نگهداشتن روزنه (و بنابراین حفظ آب)، CO_2 را با سرعتی معادل و یا بیشتر از گیاهان C_3 تثبیت کنند. دوم این که : با تغلیظ CO_2 در سلول های غلاف آوندی، تنفس نوری متوقف می شود.

گیاهان CAM :

★ متابولیسم اسید کراسولاسه ($Crassulacean Acid Metabolism = CAM$) که نوع دیگری از اختصاصی شدن فتوسنتز در گیاهان بیابانی است ، عمدتاً در گیاهان خانواده ی کراسولاسه مشاهده می شود. این نوع متابولیسم، مختص خانواده کراسولاسه نیست و در تعدادی از خانواده های نهاندانه مانند گل ناز و کالن کوئه و نیز در برخی گیاهان دیگر مانند ثعلب، کاکتوس و آناناس یافت می شود:

★ برگ این گیاهان و نیز ساقه و دمبرگ آن ها عموماً گوشتی و آبدار است . البته گیاهان گوشتی و آبداری مانند سا لیکورینا نیز وجود دارند که فاقد متابولیسم CAM هستند .

★ گیاهان CAM به لحاظ ویژگی های ساختمان داخلی برگ مشابه گیاهان C_3 هستند. از طرفی : به لحاظ نحوه تثبیت CO_2 مشابه گیاهان C_4 اند . بنابراین نتیجه این که :

درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده

گیاهان CAM همون واکنش های گیاهان C_4 رو انجام می دن اما به جای مکان های مختلف (مزوفیلی و غلاف آونری)، زمان های مختلفی رو برای انجام واکنش هاشون دارن (تاریکی و روشنایی)

به بیان دیگه :

گیاهان CAM واکنش های سلول مزوفیلی گیاهان C_4 رو در تاریکی و واکنش های سلول غلاف آوندی رو در روشنایی به انجام می رسونن !

★ ویژگی های متابولیسم CAM :

1- در برگ گیاهان CAM ، روزنه ها در طول شب (خنک) بازند و در روز (گرم و خشک) بسته. چرخه باز و بسته شدن روزنه ها در گیاهان CAM، عکس سایر گیاهان است. از آن جا که این گیاهان بومی نواحی بیابانی اند ، بسته شدن روزنه ها در طول روز سبب کاهش تعرق در آن ها و ذخیره ی آب در این گیاهان می شود.

اما از طرفی :

مسیر خروج H_2O و ورود CO_2 یکی است !

از این رو :

تثبیت اولیه CO_2 (اسیمیلسیون) که نیازمند ورود CO_2 جو است ، در شب صورت می گیرد.

2- پذیرنده چرخه های C_4 و CAM (فسفوانول پیرووات) از تجزیه ی نشاسته و سایر قندها حاصل می شود.


3- اسید ما لیک در گیاهان CAM در واکنش های بزرگ سلول های مزوفیلی برگ تولید می شود.

4- در طول روز تعداد اسیدهای آلی موجود در برگ کاهش می یابد (مصرف اسید ما لیک موجود در واکنش ها = افزایش PH

برگ). بر عکس، در طول شب تعداد اسیدهای آلی موجود در برگ افزایش می یابد (همراه با کاهش PH برگ). این چرخه شبانه روزی تشکیل اسیدهای آلی با چرخه شبانه روزی باز و بسته شدن روزنه ها همراه است (در طول شب که روزنه ها بازند ، CO_2 وارد و تثبیت میشه ، اسید آلی سنتز میشه و تراکم اسید میره بالا ، برعکسشم در طول روز رخ می ده)

درسنامه تفسیری فصل 6 زیست شناسی 3 : از انرژی به ماده

★ خلاصه ی چرخه CAM :



در گیاهان CAM ، شب هنگام ، دی اکسید کربن در واکوئل ها به صورت اسید آلی (اسید مالیک) تثبیت می شود. طی روز که دما بالا و رطوبت کم است ، روزنه ها بسته اند ، تا از انجام تعرق که می تواند برای گیاه مرگ آور باشد ، ممانعت کنند . اسیدهای آلی که در شب تشکیل شده اند ، در روز ، در سیتوسل دی اکسید کربن آزاد می کنند (دکربوکسیله می شوند) . دی اکسید کربن به درون کلروپلاست ها انتشار می یابد و وارد چرخه ی کالوین می شود که مولکول های پر انرژی مورد نیاز خود را (ATP و $NADPH_2$) از واکنش های نوری فتوسنتز گرفته است .

کارایی فتوسنتز نوع CAM چندان بالا نیست. گیاهانی که این نوع فتوسنتز را انجام می دهند ، گرچه قادر به حفظ بقای خود در گرمای شدید هستند ، اما معمولاً به کندی رشد می کنند.

پایان